

Cilindrosporioza - Cylindrosporiose

CILINDROSPORIOZA

Descriere

Cylindrosporium (boala petelor albe) nu este foarte răspândită în Germania, însă este foarte des întâlnită în Anglia și Franța.

Din toamnă apar, pe ambele părți ale frunzelor rapiței de toamnă, mai întâi niște pete alb-gălbui și rotunde, care apoi se măresc și se întâlnesc una cu cealaltă, ajung la o culoare maro deschis și acoperă frunzele.

Lacerațiile epidermei, frunzele deformate, frunzele de pe tulpină îndoite în formă de seceră și frunzele moarte și uscate rămân atârnate de tulpină. Mai mult decât atât, apar pete lunguițe pe tulpini cu margini maro și lacerații asemănătoare cu sporii, silicve incomplet dezvoltate, deformate sau explodate. În cazul unei infestări timpurii puternice, plantele se dezvoltă slab și rămân în creștere.

Daună



Simptome pe tulpină



Deformări ale silicvei



*Deformări ale frunzei-
infestare precoce*

Cilindrosporioza - Cylindrosporiose

Pragul daunelor

Agentul patogen dăunător are o mai mare relevanță în vreme de toamnă blândă și iarnă. Însă acest lucru duce de cele mai puține ori la pierderile recoltelor.

Combatere

Folosirea regulată de Triazol diminuează în majoritatea cazurilor o infestare a culturilor care să fie relevantă pentru recoltă.