

Igiena agricolă

IGIENA AGRICOLĂ: PREVENIREA DĂUNĂTORILOR ȘI BOLILOR

Combaterea rapiței sălbatice poate reduce dăunătorii și bolile.



Paie de rapiță

În regiuni unde rapița este foarte des cultivată, rotația culturilor este un factor sustenabil pentru o cultură de rapiță de succes. Un management al rotației culturilor prudent poate reduce infestarea rapiței de toamnă cu boli și dăunători.

Eliminarea completă a vechilor paie și prelucrarea atentă a solului joacă un rol important. Aceste măsuri conduc la:

- *Înteruperea „podului verde”*
- *Crearea condițiilor optime de germinare pentru rapița sălbatică și pentru buruieni/plante ierboase*
- *Eliminarea materialelor infecțioase*
- *Alterarea ciclului de reproducere al diverselor organisme dăunătoare*

Combaterea rapiței sălbatice

Rămășițele treieratului, 100 kg/ha până la 300 kg/ha – în unele cazuri până la 800 kg/ha, din rapița sălbatică sunt o practică comună. Acest lucru este un multiplu al cantității normale de semănat de rapiță de toamnă. Cel mai înalt scop după treierarea rapiței trebuie să fie dezvoltarea completă și eliminarea ulterioară a rapiței sălbatice, în decursul a patru săptămâni.

Reducerea dăunătorilor și bolilor prin prelucrarea solului, stropire și alegerea hibridului.

Cele mai bune rezultate de germinare se obțin fără prelucrarea paielor, dacă este suficientă umiditate (condens). Acest lucru se schimbă odată cu seceta! O prelucrare pe cât se poate de superficială cu solidificarea resturilor finale are avantaje clare.

Desconsiderarea acestor principii și pregătirea ulterioară patului geminativ în profunzime duc la reapariția vechilor lăstari în următorii ani. Toate semințele care nu se află pe zona germinativă își induc o stare de latență și pot rezista acolo până la 10 ani.

Mai mult, prin eliminarea paielor rămase de rapiță și a miriștei se reduc o mulțime de boli și dăunători.